Modélisation macroscopique de l'évolution temporelle d'une transformation chimique

Rappel : description d'une transformation chimique à l'échelle macroscopique

→ modèle de la réaction chimique → réactifs et produits → équation de réaction

Exemple du modèle de la réaction d'oxydo-réduction :

I_2 responsable de la coloration

$S_2O_8^{2-}$: ion peroxodisulfate

oxydant/réducteur
gagne perd

oxydation = perte d'électrons

réduction = gain d'électrons

équation de réaction d'oxydo-réduction

transfert de $2e^-$

1. Réalisation du suivi temporel de la concentration d'un réactif ou produit

$I_2(aq)$ seul responsable d'une coloration → absorbance dans le visible (470 nm)

$$[I_2] = \frac{A}{4,6 \times 10^3}$$

2. Vitesse volumique d'apparition d'un produit

Entre 1,2 min et 5,8 min :

$$v_{\text{moy,app,I}_2} = \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t} = \frac{+0,10 \text{ mmol.L}^{-1}}{4,6 \text{ min}} = 0,022 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

↑ vitesse volumique
↑ coefficient directeur de $\mathcal{D}$

si $\Delta t \rightarrow 0$

$$v_{\text{app,I}_2}(1,2 \text{ min}) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0,27 - 0,05}{2,6 - 0} = 0,085 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

vitesse instantanée $\neq v_{\text{moy}}$!

coefficient directeur de la tangente T
à la courbe $[I_2](t)$ à 1,2 min

nombre dérivé de la fonction $[I_2](t)$ calculé à $t = 1,2 \text{ min}$

$$v_{\text{app,I}_2}(t) = \frac{d[I_2]}{dt}(t) = \text{coefficient directeur de la tangente à la courbe } [I_2](t) \text{ à } t$$

calculée à un instant t

dérivée temporelle de la fonction $[I_2]$

4. Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$

5. Les facteurs cinétiques → paramètres physiques dont la variation modifie la vitesse d'une réaction

D'autres facteurs cinétiques possibles : la lumière , la nature du solvant

6. Utilisation d'un catalyseur

→ espèce chimique ajoutée qui accélère une réaction

: pas dans l'équation de réaction !

+ Fe^{2+}

catalyseur

Fe^{2+} consommé mais
intégralement régénéré à la fin !

accélère la réaction

$V_{mél} = 20\text{ mL}$
 25°C

À retenir !

- suivi temporel possible de :
- l'absorbance
 - la pression
 - la conductivité

Les facteurs cinétiques

→ paramètres physiques dont la variation modifie la vitesse d'une réaction